

گد کنترل

472

A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

تجربه
تمکن

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته زیست‌شناسی دریا - (گد ۲۲۳۶)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۰۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - فیزیولوژی جانوران آبزی - زیست‌شناسی دریا - جانورشناسی دریا - بوم‌شناسی پیشرفته دریا	۱۰۰	۱	۱۰۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱- رابطه هر میلی‌متر فشار منفی پرده جنبی، با میزان فشار مثبت حبابچه‌ای چیست؟
- برابر است.
 - دو برابر است.
 - ربطی به یکدیگر ندارند.
 - برابر با مقدار هوای باقیمانده است.
- ۲- در ماهیان بالغ فیزیوستوم، منشأ ورود گاز به کیسه شنا چیست؟
- هوای بلعیده شده
 - نیتروژن جوی
 - خون
 - لوله گوارش
- ۳- کدام هورمون تنظیم‌کننده فرایند پوست‌اندازی در سخت‌پوستان است؟
- آدیپوکینتیک هورمون
 - اکدیسون
 - اینترفرون
 - کاردیواکتیوپیتید
- ۴- کدامیک جزو وظایف هورمون Hyperglycaemic در سخت‌پوستان است؟
- افزایش ضربان قلب
 - افزایش سطح گلوکز هموگلوبین
 - در کدام گزینه، گوارش به صورت خارج سلولی است؟
 - از هموسیانین
 - آفراش آزادسازی O_2
 - بالا بردن فعالیت سلول‌های غدد سبز
- ۵- در کدام گزینه، گوارش به صورت خارج سلولی است؟
- هیدر آب شیرین (مرجانیان)
 - آفروذیت (پرتار)
 - اسکاریس (کرم پهن)
 - اسفتحه‌ای آهکی
- ۶- ساده‌ترین ساختار حسی در موجودات زنده کدام است؟
- Ocelli در مرجانیان
 - استاتوسیت در اسفنجها
 - در اوگلنا stigma
 - اجسام قارچی در حشرات
- ۷- نقش تیفلوسل در دستگاه گوارش کرم خاکی معادل کدام بخش از دستگاه گوارش طنابدران است؟
- کیسه صفرا
 - چینه‌دان در پرنده‌گان
 - سیرابی در نشخوارکنندگان
- ۸- کدام مورد، بیشترین سهم را در تشکیل خون ماهیان دارد؟
- پلاسما
 - لکوسیت‌ها
 - سرم
 - هماتوکریت
- ۹- مهم‌ترین یون در محیط داخل سلولی کدام است؟
- Cl^-
 - K^+
 - Na^+
 - SO_4^{2-}
- ۱۰- کدام مورد، موجب کاهش انتقال فعال سدیم در کلیه می‌شود؟
- افزایش ترشح رنین
 - افزایش سطح سدیم خون
 - کاهش میزان ترشح آلدوسترون
 - افزایش میزان پتابسیم خون

- ۱۱- کدام گزینه مثالی از یک ساختار اسکلت داخلی (**endoskeleton**) است؟
- ۱) ساختار حلق بیرون برنده در **Acanthocephala**
 - ۲) ساختار نای‌بندی حشرات
 - ۳) اسکلت مرجان‌های اکتوکورال
 - ۴) صدف یکپارچه در **Monoplacophora**
- ۱۲- کدام مورد جزو تأثیرات نور آدرنالین نیست؟
- ۱) انقباض رگ‌های احتشامی
 - ۲) انبساط رگ‌های احتشامی
 - ۳) افزایش قندخون
 - ۴) افزایش ضربان قلب
- ۱۳- جانوری که قادر به تحمل محدوده باریکی از تغییرات شوری در محیط پیرامون خود است را گویند.
- ۱) **stenohaline**
 - ۲) **osmoconformer**
 - ۳) **hyperosmotic**
 - ۴) **euryhaline**
- ۱۴- کدام گزینه، در مورد تفاوت بین گردش خون باز و بسته در جانوران درست است؟
- ۱) گردش خون بسته منحصر به جانوران طنابدار است.
 - ۲) در گردش خون بسته امکان انتقال گازهای تنفسی نیست.
 - ۳) حجم خون در گردش خون باز تقریباً ۴ برابر گردش خون بسته است.
 - ۴) در گردش خون باز برای به حرکت در آوردن خون نیازی به فعالیت پمپاژی قلب نیست.
- ۱۵- اثر بوهر (**Bohr effect**)، توصیف‌کننده کدام گزینه است؟
- ۱) افزایش آزادسازی O_2 از هموگلوبین در پاسخ به کاهش میزان CO_2 در بافت
 - ۲) افزایش ظرفیت حمل اکسیژن به وسیله هموگلوبین در پاسخ به افزایش CO_2 در بافت‌ها
 - ۳) کاهش ظرفیت حمل اکسیژن به وسیله هموگلوبین با افزایش O_2 محلول در پلاسمای
 - ۴) کاهش میزان هموگلوبین اشباع شده با O_2 در اثر افزایش میزان CO_2
- ۱۶- هضم سلولز در گیاهخواران، به کدام شکل صورت می‌گیرد؟
- ۱) با فعالیت غیرهوازی باکتری‌های همزیست در لوله گوارش
 - ۲) با ترشح آنزیم سلولاز از سلول‌های روده
 - ۳) با ترشح سلولاز از غدد بزاقی در حین نشخوار
 - ۴) به وسیله هضم مکانیکی در بخش سیرابی و شیردان گیاهخواران
- ۱۷- مرکز حس بینایی، به ترتیب در کدام بخش مغز فرد بالغ، جنبین رشد کرده و جنبین اولیه قرار دارد؟
- ۱) لب بینایی - مزونسفال - مغز میانی
 - ۲) لب بینایی - متانسفال - مغز میانی
 - ۳) لب بینایی - متانسفال - ملینسفال - مغز میانی
 - ۴) تکوم بینایی - متانسفال - مغز عقبی
- ۱۸- ساختار اسکلتی مورد نیاز برای حرکت بازوها تانتاکولی سرپایان، کدام است؟
- ۱) صدف تحلیل رفته خارجی
 - ۲) اسکلت هیدرواستاتیکی
 - ۳) اندواسکلت کربنات کلسیمی
 - ۴) اسپیکولهای سیلیسی مزودرمی
- ۱۹- کدام مورد، از تطابق‌های جانوران خونگرم برای حفظ دمای بدن در محیط‌های سرد محسوب می‌شود؟
- ۱) تعريق (**evaporation**)
 - ۲) زندگی حفاری (**Fossorial life**)
 - ۳) Counter current heat exchange
 - ۴) Nocturnal life
- ۲۰- میزان فیلتراسیون گلومرولی (**GFR**)، در کدام گروه از ماهیان بیشتر است؟
- ۱) ماهیان مهاجر
 - ۲) ماهیان آب شور
 - ۳) ماهیان آب شیرین
 - ۴) ماهیان عمیق دریا

- ۲۱ عامل ایجاد کننده فشار اسمزی در مایعات زیستی کدام است؟
- ۱) یون سدیم و کلر
 - ۲) یون‌های یک ظرفیتی
 - ۳) مجموعه یون‌ها و مولکول‌ها
 - ۴) آلبومین و پروتئین‌های محلول
- ۲۲ آورت شکمی در دستگاه گردش خون ماهیان، به کدام یک منتهی می‌شود؟
- ۱) آورت پشتی
 - ۲) شریان اربیتال
 - ۳) سیاهرگ‌های واپران آبششی
- ۲۳ *gill raker* در کدام گونه توسعه بیشتری دارد؟
- ۱) *Clupeonella cultiventris*
 - ۲) *Oncorhynchus mykiss*
- ۲۴ در یک کارگاه پرورش، بچه ماهیان به طور غیرطبیعی در سطح فوقانی حوضچه‌ها تجمع داشته و حضور کمتری در ستون آب و عمق دارند. علت احتمالی چیست؟
- ۱) جستجوی غذا
 - ۲) گوارش نامناسب روده‌ای
 - ۳) فتوتروپیسم مثبت
 - ۴) اختلال مکانیسم تعادل در CNS
- ۲۵ کدام مورد زیر، تقریباً بر همه سلول‌های بدن ماهیان تأثیر دارد؟
- ۱) هورمون‌های تیروئید
 - ۲) مینرالو کورتیکوئیدها
 - ۳) کاته کولامین‌ها
- ۲۶ ساختار **Capula** در خط جنبی ماهیان چیست؟
- ۱) ژله‌ای
 - ۲) عضلانی
 - ۳) موکوسی
- ۲۷ «نوروتانسミترها» از کدام نوع سلول‌ها آزاد می‌شوند؟
- ۱) سیناپس سلولی
 - ۲) سلول عصبی
 - ۳) سلول عضلانی
- ۲۸ در مطالعه ایمونوهیستوشیمی بافت آبشش، نقش **NaK ATPase** چیست؟
- ۱) پادتن اولیه
 - ۲) پادتن ثانویه
 - ۳) آنتی‌ژن اولیه
- ۲۹ «ترومبوسیتوپنی»، منجر به کدام عارضه می‌شود؟
- ۱) کاهش ایمنی ارگانیسم
 - ۲) افزایش فشارخون
- ۳۰ کدام هورمون منشأ آمینو اسیدی ندارد؟
- ۱) تیروکسین
 - ۲) استرادیول
- ۳۱ پتروبودها جزو کدام گروه جانوری هستند و در چه محیطی زندگی می‌کنند؟
- ۱) پرتاران - بنتیک
 - ۲) پرتاران - پلازیک
 - ۳) نرم‌تنان - بنتیک
- ۳۲ مهم‌ترین فاکتور محیطی که بر حضور، عدم حضور و نوع مایوفون‌ها (**Meiofauna**) اثر می‌گذارد، کدام است؟
- ۱) اندازه ذرات رسوب
 - ۲) عمل امواج
 - ۳) شوری
 - ۴) دما
- ۳۳ **Facultative symbiosis**، حالتی از همزیستی است که در آن
- ۱) دو گونه بر همدمیگر اثر منفی دارند.
 - ۲) هر دو گونه برای زندگی به همدمیگر وابسته هستند.
 - ۳) هر دو گونه می‌توانند مستقل از همدمیگر نیز زندگی کنند.
 - ۴) یک گونه سود می‌برد و دیگری نه سود می‌برد نه زیان

- ۳۴- کدام مورد، از علل مهاجرت عمودی زئوپلانکتون‌ها نیست؟
- اجتناب از تغییرات دما و شوری
 - اجتناب از صیاد
 - اجتناب از دامنه Detritus
- ۳۵- کدامیک از گروه‌های جانوری زیر، به ترتیب از راست به چپ هولوپلانکتون و مروپلانکتون هستند؟
- مواد معلق
 - Echinodermata , Cnidaria
 - Ctenophora , Decapoda
 - Decapoda , Copepoda
 - Copepoda , Ctenophora
- ۳۶- دلایل اصلی در ایجاد تنوع گونه‌ای پایین و تراکم بالا که به صورت عمومی در اکثر مصب‌ها دیده می‌شود، کدامند؟
- میزان زیاد دما و ذرات معلق
 - میزان کم شوری و اکسیژن
 - شرایط پرتنش و میزان زیاد مواد غذی
 - جلبک‌هایی که به صخره‌ها می‌چسبند، چه نام دارند؟
- ۳۷- دلایل اصلی در ایجاد تنوع گونه‌ای پایین و تراکم بالا که به صورت عمومی در اکثر مصب‌ها دیده می‌شود، کدامند؟
- میزان زیاد دما و ذرات معلق
 - میزان کم شوری و اکسیژن
 - شرایط پرتنش و میزان کم مواد غذی
 - جلبک‌هایی که به صخره‌ها می‌چسبند، چه نام دارند؟
- ۳۸- حلقه میکروبی (Microbial loop)، در کدام محیط آبی نقش بیشتری دارد؟
- اليگوتروفیک
 - مزوتروفیک
 - توالید اولیه در مناطق گرمسیری و قطبی، به ترتیب محدود به کدام عامل است؟
- ۳۹- حلقه میکروبی (Microbial loop)، در کدام محیط آبی نقش بیشتری دارد؟
- اليگوتروفیک
 - مزوتروفیک
 - دما - مواد غذی
 - شوری - دما
 - نور - مواد غذی
- ۴۰- ویروس‌ها، در کدامیک از گروه‌های پلانکتونی زیر قرار می‌گیرند؟
- Nanoplankton
 - Femtoplankton
 - Picoplankton
 - Microplankton
- ۴۱- کدام گروه‌ها، به مقدار زیادی سیلیس برای تشکیل پوسته نیاز دارند؟
- شعاعیان - سیلیکوفلازله‌ها - داینوفلازله‌ها
 - روزنداران - دیاتومه‌ها - جلبک‌های مرجانی
 - دیاتومه‌ها - روزنداران - داینوفلازله‌ها
 - دیاتومه‌ها - شعاعیان - سیلیکوفلازله‌ها
- ۴۲- در چه حالتی از ماه رخ می‌دهد؟ Neap tide
- ماه نو
 - ماه کامل
 - نیمه اول ماه
 - ربع اول و سوم ماه
- ۴۳- متنوع‌ترین و پیچیده‌ترین اکوسیستم دریایی کدام است؟
- آب‌سنگ‌های مرجانی
 - جنگل‌های حررا
 - پنهانهای گلی
 - علف‌زارهای دریایی
- ۴۴- مهاجرت عمودی در کدام گروه دیده می‌شود؟
- بنتوزها
 - فیتوپلانکتون‌ها
 - زئوپلانکتون‌ها
 - پستانداران دریایی
- ۴۵- کدام مورد جزو مکانیسم‌های غوطه‌وری پلانکتون‌ها نیست؟
- کاهش سطح مقاومت بدن
 - استفاده از یون‌های سبک
 - کارایی هیدرودینامیک

- ۴۷- شکل بدن در کدام نکتون باعث افزایش سرعت حرکت و شنا می‌شود؟
 ۱) پروانه ماهیان ۲) تون ماهیان ۳) سفره ماهیان ۴) مار ماهیان
- ۴۸- در نهنگ اسپرم صدای خروجی توسط تقویت و اصوات برگشتی توسط دریافت می‌شود.
 ۱) فک بالا - فک پایین ۲) فک پایین - ملون ۳) ملون - فک بالا ۴) ملون - فک پایین
- ۴۹- در زیرمحدوده ترمولاین، تغییرات دمای آب چگونه است؟
 ۱) ابتدا کاهشی سپس افزایشی ۲) دارای تغییرات اندک ۳) کاهشی افزایشی
- ۵۰- «دریاچه نسبتاً جوان که دارای آبی شفاف و غنی از اکسیژن بوده و میزان تولید در آن کم است»، با کدام گزینه منطبق است؟
 ۱) آلوژنیک ۲) اتوژنیک ۳) مزوتروف ۴) اولیگوتروف
- ۵۱- لارو **Pilidium** متعلق به کدام شاخه جانوری است؟
 ۱) خزه‌شکلان ۲) شانه‌داران ۳) کرم‌های روبانی ۴) کرم‌های پرتار
- ۵۲- سیستم مجاری (**Canal system**)، از ویژگی منحصر به فرد کدام شاخه جانوری می‌باشد؟
 ۱) Cnidaria ۲) Porifera ۳) Echinodermata ۴) Platyhelminthes
- ۵۳- کدامیک از ماهیان زیر معمولاً فاقد پولک هستند؟
 ۱) اره ماهیان ۲) سفره ماهیان ۳) کوسه ماهیان ۴) موش ماهیان
- ۵۴- یاخته‌های چسبناک اپیدرمی کلوبلاست، از مشخصه‌های کدامیک از جانواران زیر است؟
 ۱) هیدر (*Hydra*) ۲) سبدگل و نوس (*Euplectella*) ۳) کمریند و نوس (*Cestum*) ۴) مرجان شاخ‌گوزنی (*Acropora*)
- ۵۵- کدامیک از سلول‌های زیر در اسفنج‌ها کلارن تولید و ترشح می‌کند؟
 ۱) لوفوسایت (*Lophocyte*) ۲) کوآنوسایت (*Choanoctye*) ۳) پیناکوسایت (*Pinacocyte*) ۴) اسکلروسایت (*Sclerocyte*)
- ۵۶- در کدامیک از ماهیان زیر، بخش‌های غضروفی اسکلت بیشتر است؟
 ۱) ماهی ازونبرون ۲) ماهی بالله‌کمانی ۳) گار ماهی ۴) کفشک ماهی
- ۵۷- در کدامیک از جانوران زیر قلب خون را به هر دو طرف پمپ می‌کند؟ (در یک انقباض به یک طرف و در انقباض بعدی به طرف مقابل)
 ۱) آمفیوکسوس ۲) آفشنان دریا ۳) کرم بلوطی ۴) خیار دریابی
- ۵۸- کدام گزینه در ماهیان غضروفی، نقشی در دفع نمک‌های اضافی ندارد?
 ۱) کلیه‌ها ۲) روده ۳) غده مخرجی ۴) سلول‌های کلراید
- ۵۹- در کدام خانواده از ماهیان، باله‌های شکمی به هم جوش خورده و تشکیل یک دیسک مکنده را می‌دهد?
 ۱) گاو ماهیان - *Gobiidae* ۲) سرخو ماهیان - *Lutjanidae* ۳) تن ماهیان - *Scombridae* ۴) اسپچه ماهیان - *Leiognathidae*
- ۶۰- پدیسلازیا در کدام رده از خارپستان زیر وجود دارد?
 ۱) Crinoidea ۲) Echinoidea ۳) Holothoroidea ۴) Ophioroidea

- ۶۱- در کدامیک از گروههای جانوری زیر، کمربند تناسلی (**Clitellum**) وجود دارد؟
- (۱) زالوها
 (۲) کرم‌های پرتار
 (۳) کرم‌های پهنه
 (۴) کرم‌های پیکانی
- ۶۲- پروستومیوم چیست؟
- (۱) ناحیه تناسلی در کرم‌های روبانی
 (۲) ناحیه دهانی در کرم‌های روبانی
 (۳) ناحیه سر در برخی کرم‌های حلقوی
 (۴) ناحیه مخرج در کرم‌های حلقوی
- ۶۳- ریزوپویدیا، پای کاذب کدام گروه است؟
- (۱) آمیبی‌ها
 (۲) رادیولاریا
 (۳) فورامینیفرا
 (۴) مژهداران
- ۶۴- اندام وازنش (**Excretory organ**). در کرم‌های لوله‌ای (**Nematoda**) کدام است؟
- (۱) لوله‌های مالپیگی
 (۲) سلول‌های رنت
 (۳) متانفریدی
 (۴) پروتونفریدی
- ۶۵- در کدامیک از جانوران زیر، قلب‌های آبششی (**Branchial Hearts**) وجود دارد؟
- (۱) آمیبی‌ها
 (۲) رادیولاریا
 (۳) خیار دریایی
 (۴) ماهی مرکب
- ۶۶- در کدامیک از مفاهیم گونه (**Species Concepts**) درون‌باروری (**Inbreeding**), استقلال خزانه ژنی و پردازه اختصاصی (**Niche**)، از ملاک‌های تعریف گونه است؟
- (۱) مفهوم تکاملی گونه (**Evolutionary Species Concept**)
 (۲) مفهوم تبارشناختی گونه (**Phylogenetic Species Concept**)
 (۳) مفهوم ساخته شناختی گونه (**Typological Species Concept**)
 (۴) مفهوم زیست‌شناختی گونه (**Biological Species Concept**)
- ۶۷- کدام گروه از ماهیان زیر کیسه شتا دارد؟
- (۱) تون ماهیان
 (۲) سرخو ماهیان
 (۳) کفشک ماهیان
 (۴) کوسه ماهیان
- ۶۸- غلظت عنصر وانادیوم در خون کدام جانوران بسیار بیشتر از محیط آبی اطراف آن‌ها است؟
- (۱) تونیکاتا
 (۲) لامپری‌ها
 (۳) کرم‌های پهنه
 (۴) کرم‌های پرتار
- ۶۹- کدام جانور از نظر راسته جانورشناسی با دیگران متفاوت است؟
- (۱) شیر دریایی
 (۲) فوک‌ها
 (۳) گاو دریایی
 (۴) والروس
- ۷۰- کدام گروه از کرم‌های پهنه، به طور اختصاصی در حالت بالغ انگل موجودات آبزی هستند؟
- (۱) ترماتودا
 (۲) توربلاریا
 (۳) سستودا
 (۴) مونوزنه آ
- ۷۱- کدامیک از مرجان‌های زیر جزو مرجان‌های صخره‌ساز (**Hermatypic**) هستند؟
- (۱) قلم‌های دریا
 (۲) مرجان‌های سیاه
 (۳) مرجان‌های بادبزنی
 (۴) مرجان‌های شاخ گوزنی
- ۷۲- کدامیک از محیط‌های دریایی زیر را به عنوان یک اکوتون نیز می‌توان در نظر گرفت؟
- (۱) ریف‌های مرجانی
 (۲) علفزارهای دریایی
 (۳) ناحیه بین جزر و مدی
 (۴) گودال‌های اقیانوسی
- ۷۳- کدام گروه از جانوران زیر از ذرات مواد آلی لابه‌لای رسوبات تعذیب می‌کند؟
- (۱) بارناکل‌ها
 (۲) کیتون‌ها
 (۳) خیارهای دریایی
 (۴) ستاره‌های دریایی

- ۷۴- همه جملات زیر صحیح‌اند، به‌جز:

- ۱) در مناطق معتدل‌های میزان تولید یک چرخه فصلی را نشان می‌دهد.
- ۲) تعداد سطوح غذایی در آب‌های یوتروفیک بیشتر از آب‌های الیگوتروفیک است.
- ۳) غلظت نوترینت‌ها در سطح آب‌های اقیانوسی کمتر از قسمت‌های عمیق است.
- ۴) جریان‌های چرخشی مرکزی (Central gyres) در اقیانوس‌ها از مناطق با تولید بسیار پایین است.

- ۷۵- کدام گزینه شرایط دریاهای مناطق معتدل‌های در طول زمستان را نشان می‌دهد؟

- ۱) ستون آب مخلوط شده، مواد مغذی بالا، تولید پایین
- ۲) ستون آب لایه‌بندی شده، مواد مغذی بالا، تولید بالا
- ۳) ستون آب مخلوط شده، مواد مغذی پایین، تولید بالا
- ۴) ستون آب لایه‌بندی شده، مواد مغذی پایین، تولید پایین

- ۷۶- اکوسیستم‌های مصبی:

- ۱) عمدتاً دارای نوسانات زیاد میزان شوری و نوسانات کم دما می‌باشد.
- ۲) عمدتاً میزان بالایی detritus داشته و پدیده out welling در آن‌ها اتفاق می‌افتد.
- ۳) اغلب بستری از ماسه و گل نرم داشته که غنی از اکسیژن و فقر از نظر مواد آلی می‌باشد.
- ۴) نسبت به سواحل صخره‌ای تنوع گونه‌ای بیشتری دارند و از جمله پر تولیدترین مناطق روی زمین محسوب می‌شوند.

- ۷۷- سنجش BOD برای تعیین مقدار کدام گروه در آب به کار می‌رود؟

- ۱) بار میکروبی
- ۲) مواد مغذی
- ۳) هیدروکربن‌های نفتی
- ۴) مواد آلی معلق و محلول

- ۷۸- کدام مورد حذف رقابتی (Competitive exclusion) را بیان می‌کند؟

- ۱) موجودات با جثه بزرگ‌تر موجودات کوچک‌تر را در رقابت حذف می‌کنند.
- ۲) گونه‌هایی که فراوانی بیشتری دارند گونه‌های با فراوانی کمتر را از طریق رقابت حذف می‌کنند.
- ۳) دو گونه در زمان محدودیت منابع نمی‌توانند یک نیچ یکسان را به طور نامحدود اشغال کنند.
- ۴) در رقابت برای یک منبع مشترک، گونه‌های دارای چرخه زندگی ساده‌تر حذف می‌شوند.

- ۷۹- رسوبات آهکی، ناشی از حیات کدام گروه‌های زیر است؟

- ۱) روزنه‌داران، کوکولیتوفورها، پتروپودها
- ۲) روزنه‌داران، دیاتومه‌ها، کوکولیتوفورها
- ۳) روزنه‌داران، پتروپودها، شعاعیان (رادیولارها)
- ۴) شعاعیان، روزنه‌داران، کوکولیتوفورها

- ۸۰- تنوع زیستی در مقیاس جهانی به ترتیب تحت تأثیر کدام عامل قرار دارد و رابطه آن چگونه است؟

- ۱) ارتفاع از سطح دریا - مستقیم
- ۲) ارتفاع از سطح دریا - عکس
- ۳) عرض جغرافیایی - مستقیم

- ۸۱- دلیل اصلی تنوع گونه‌ای کم و تراکم زیاد افراد در اکثر مصب‌ها، به ترتیب کدام است؟

- ۱) اکسیژن کم - ذرات معلق زیاد
- ۲) تغییر فاکتورهای محیطی - مواد مغذی زیاد
- ۳) مواد مغذی کم - تغییر فاکتورهای محیطی

- ۸۲- جوامع کلپ محدود به هستند.

- ۱) بسترها سخت، آب‌های سرد و غنی از مواد مغذی کم
- ۲) بسترها سخت، آب‌های سرد و مواد مغذی کم
- ۳) بسترها سخت، آب‌های گرم و مواد مغذی کم

- ۸۳ - محدوده شمالی و جنوبی پراکنش جغرافیایی جنگل‌های مانگرو در جهان، توسط کدام عامل کنترل می‌شود؟
 ۱) شوری ۲) دما
 ۳) وجود بستر گلی ۴) مواد آلی
- ۸۴ - ویژگی بارز مصب‌های منفی (Negative estuaries) کدام است؟
 ۱) اکسیژن کم ۲) تبخیر کم
 ۳) دمای زیاد ۴) شوری زیاد
- ۸۵ - به کدام گروه از بنتوزها، جانوران بین ذره‌ای (Interstitial) نیز گفته می‌شود؟
 ۱) Microfauna ۲) Meiofauna ۳) Macrofauna ۴) Epifauna
- ۸۶ - کدام گروه شباهت کمتری به گیاهان گلدار خشکی دارد؟
 ۱) مانگروها ۲) گیاهان سالن مارش ۳) علفهای دریایی
 ۴) جلبک‌های قهوه‌ای
- ۸۷ - کدام گروه از میکروب‌های دریایی زیر اتوتروف هستند؟
 ۱) کوکولیتوفورها ۲) فورامینیفرها
 ۳) مژه‌داران ۴) شعاعیان
- ۸۸ - کمترین میزان اکسیژن محلول و مواد مغذی، به ترتیب از راست به چپ در کدام لایه‌های آبهای دریایی وجود دارد؟
 ۱) Epipelagic-Mesopelagic ۲) Mesopelagic-Bathypelagic ۳) Bathypelagic-Mesopelagic ۴) Mesopelagic-Epipelagic
- ۸۹ - در کدام سواحل به ترتیب عمل امواج کمتر و ناحیه بین جزر و مدی وسیع‌تر است؟
 ۱) گلی - گلی ۲) صخره‌ای
 ۳) صخره‌ای - گلی ۴) صخره‌ای - صخره‌ای
- ۹۰ - بیشترین تغییر تراز آب در جزر و مد کدام منطقه کشورمان مشاهده می‌شود؟
 ۱) بندر انزلی ۲) خلیج گواتر
 ۳) خور موسی ۴) سواحل قشم
- ۹۱ - فراوان‌ترین تولیدکنندگان سواحل گلی کدام‌اند؟
 ۱) دیاتوم‌ها ۲) داینوفلاژله‌ها
 ۳) سیانوفیت‌ها ۴) جلبک‌های سبز
- ۹۲ - براساس قانون بردباری شلفورده، جانداری که دامنه بردباری وسیعی دارد، معمولاً دارای کدام ویژگی‌ها است؟
 ۱) پراکنش محدود و اندازه جمعیت کوچک ۲) پراکنش محدود و اندازه جمعیت بزرگ
 ۳) پراکنش وسیع و اندازه جمعیت بزرگ ۴) پراکنش وسیع و اندازه جمعیت کوچک
- ۹۳ - کدام ویژگی در موجودات دارای استراتژی دیده نمی‌شود؟
 ۱) بازماندگی کم در نوزادان ۲) تولید تعداد تخم زیاد
 ۳) متأثریت والدینی ۴) تولیدمثل سریع
- ۹۴ - «متئوسنامی» چیست؟
 ۱) سونامی ناشی از رانش بستر دریا ۲) سونامی ناشی از انفجار گازهای زیر بستر
 ۳) موج بلند ناشی از آتش‌فشان‌های دریایی ۴) سونامی نسبتاً خفیف در اثر تغییر فشار هوا
- ۹۵ - بعد از سدیم و کلر، کدام عامل بیشترین سهم را در ترکیب آب اقیانوس‌ها دارد؟
 ۱) منیزیم ۲) کلسیم
 ۳) سولفات ۴) فسفات
- ۹۶ - کسب جلبک همزیست در مرجان‌های سخت در چه مرحله‌ای صورت می‌گیرد؟
 ۱) بعد از نشتن لارو بر روی بستر سخت ۲) بلافاصله بعد از تخم‌ریزی
 ۳) در مرحله لارو پلانولا ۴) بعد از تشکیل کلونی

- ۹۷- مهم‌ترین عامل ایجاد کشنده در دریاهای آزاد کدام است؟

۲) نیروی گرانش خورشید

۴) گردش زمین به دور خورشید

- ۹۸- کدام گزینه در مورد علفهای دریایی (Sea grass) درست است؟

۱) از طریق تولید اسپور (spore) تولیدمثل می‌کنند.

۲) ساختار ریشه آن‌ها شبیه گیاهان خشکی است.

۳) از طریق ساختاری به نام fast Hold به بستر می‌چسبند.

۴) از پدیده انتشار برای انتقال مواد از خارج به داخل گیاه استفاده می‌کنند.

- ۹۹- دو اکوسیستم شاخص آب‌های مناطق گرمسیری کدام‌اند؟

۲) جنگل‌های حرا - کلپ‌ها

۴) کلپ‌ها - علفزارهای دریایی

۱) آبسنگ‌های مرجانی - کلپ‌ها

۳) جنگل‌های حرا - آبسنگ‌های مرجانی

- ۱۰۰- تعداد سطوح تغذیه‌ای و میزان کارایی در انتقال انرژی (Efficiency) در مناطق فراجوشی (Upwelling) نسبت به مناطق باز اقیانوسی به ترتیب چگونه است؟

۱) بیشتر - کمتر

۲) کمتر - بیشتر

۳) کمتر - مساوی

۴) مساوی - کمتر





