

کد کنترل

481

A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکز) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته بیوانفورماتیک - (کد ۲۲۴۶)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - زیست‌شناسی سلولی و مولکولی - آمار و احتمال - ساختمندانه و الگوریتم - ریاضیات گسسته	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

- ۱ حضور کدامیک از لیبیدهای زیر در یک نیم لایه از غشاء باعث ایجاد خمیدگی (Curvature) در آن می شود؟
- (۱) اسفنگنوسیلین
 (۲) فسفاتیدیل سرین
 (۳) فسفاتیدیل کولین
 (۴) فسفاتیدیل اتانول آمین
- ۲ کدام گزینه در ارتباط با پمپ های ABC صحیح است؟
- (۱) تنها در پمپ کردن یون ها نقش دارند.
 (۲) باعث ایجاد مقاومت دارویی در سلول های سلطانی می گردند.
 (۳) در یوکاریوت ها بیشتر در جذب مواد مغذی دخالت دارند.
 (۴) در پروکاریوت ها بیشتر در دفع سموم سلولی دخالت دارند.
- ۳ کدام زیرواحد آنزیم RNA Polymerase پروکاریوتی، ناحیه Up-element پرومотор را تشخیص می دهد؟
- (۱) σ_70
 (۲) α CTD
 (۳) α NTD
 (۴) Syndecan
- ۴
- (۱) یک نوع مولکول چربی در بعضی از انواع غشا های سلولی هستند.
 (۲) مولکول پیام رسان داخل سلول هستند.
 (۳) پروتو گلیکان سطح سلول هستند.
 (۴) پیتید ضد سیری هستند.
- ۵ کدام گزینه در موردتوالی های SINE در زنوم صحیح است؟
- (۱) پروتئین های بیان شده از SINE (ORE1,2) موجب انتقال آن می شود.
 (۲) فراوان ترین SINE ها در انسان عناصر Alu هستند.
 (۳) در انسان، اندازه آن ها حدود ۶ کیلو باز است.
 (۴) به طور مستقیم به صورت DNA منتقل می شوند.
- ۶ کدام گزینه نشان دهنده پروتئین های تشکیل دهنده همی دسموزوم است؟
- (۱) اینتگرین - فیلامنت های بینابینی
 (۲) اینتگرین - فیلامنت های اکتین
 (۳) اوکلودین - فیلامنت های بینابینی
 (۴) کاده رین - فیلامنت های اکتین
- ۷ پروتئین های دارای ساختار تاخورده، از غشاء کدامیک از اندامک ها می توانند عبور کنند؟
- (۱) هسته - پراکسی زوم
 (۲) شبکه آندوپلاسمی - کلروپلاست
 (۳) میتوکندری - کلروپلاست

- ۸ همه عبارات زیر در رابطه با عملکرد متابلاپروتئازها در ایجاد سرطان صحیح‌اند، به جز:
- تخرب اجرای ماتکریکس خارج سلولی
 - ایجاد ساختارهایی به نام Amyloid plaque
 - برش بخش بیرونی بعضی از ترانس ممبرن پروتئین‌ها
 - برش بخش سیتوزومی بعضی از ترانس ممبرن پروتئین‌ها
- ۹ کدام عامل ترجمه پروکاریوتی در نزدیکی به جایگاه A ریبوزوم متصل می‌شود؟
- IF ۲ (۲)
IF ۳, IF ۱ (۴)
IF ۳ (۳)
- ۱۰ کدام هورمون با افزایش هیدرولیز تری‌گلیسریدها در سلول‌های چربی، باعث ایجاد مقاومت انسولین در سلول‌های کبدی و ماهیچه می‌شود؟
- TNF α (۴)
 α (۴)
TGF - β (۳)
 β (۳)
Delta (۲)
 γ (۲)
Wnt (۱)
 θ (۱)
- ۱۱ کدام زیر واحد آنزیم DNA پلی‌مراز III پروکاریوتی نقش عمده‌ای در ایجاد Processivity آنزیم دارد؟
- الف) غلظت DnaA
ب) نسبت ADP به ATP
ج) غلظت آنزیم Dam methglase
د) غلظت پروتئین seqA
- ۱۲ چند مورد در کنترل شروع همانندسازی DNA در باکتری‌ها نقش دارند؟
- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)
- ۱۳ با توجه به نمودار مستطیلی مقدار میانه کدام است؟
- ۱۲/۵ (۱)
۱۵ (۲)
۱۷/۵ (۳)
۲۰ (۴)
- نمودار مستطیلی:
-
- | x | f _i |
|----|----------------|
| 5 | 10 |
| 10 | 5 |
| 15 | 15 |
| 20 | 4 |
- ۱۴ در یک سیاست اصلاح وضعیت درآمد خانوارهای یک شهر که دارای حداقل درآمد ۵ واحد در ماه هستند، ۵ واحد از درآمد هر یک از خانوارها کسر می‌شود. ضریب تغییرات درآمد چه تغییری می‌کند؟
- ۱) کاهش می‌یابد.
۲) افزایش می‌یابد.
۳) نمی‌توان اظهارنظر کرد.
۴) تغییر نمی‌کند.
- ۱۵ تاسی را در نظر بگیرید که احتمال پیشامدهای ساده در آن متناسب با عکس مقدار خال مشاهده شده باشد، اگر $B = \{2, 3\}$ و $A = \{2, 4\}$ باشند، مقدار $P(A \Delta B)$ کدام است؟
- $\frac{16}{21}$ (۲)
 $\frac{62}{63}$ (۴)
 $\frac{1}{63}$ (۱)
 $\frac{5}{21}$ (۳)

- ۱۶- دو پیشامد A و B را در نظر بگیرید. اگر این دو پیشامد با احتمال $\frac{1}{6}$ بهطور همزمان رخ دهند و با احتمال $\frac{1}{3}$ هیچ کدام رخ ندهند. کدام گزینه صحیح است؟

$$P(A) = P(B) + \frac{11}{12} \quad (1)$$

$$P(A) + P(B) = \frac{3}{5} \quad (2)$$

$$P(A) + P(B) = \frac{5}{6} \quad (3)$$

$$P(A) + \frac{11}{12} = P(B) \quad (4)$$

- ۱۷- در یک امتحان تستی ۴ جوابی با ۵ سؤال، احتمال اینکه دانشجویی به تصادف پاسخ حداقل ۴ سؤال را درست جواب دهد، کدام است؟

$$\frac{5}{64} \quad (1)$$

$$\frac{1}{64} \quad (2)$$

$$\frac{3}{64} \quad (3)$$

$$\frac{6}{64} \quad (4)$$

- ۱۸- علی و احمد به همراه ۵ نفر دیگر به تصادف در یک صف می‌ایستند. احتمال اینکه دقیقاً سه نفر بین آن‌ها باشد، کدام است؟

$$\frac{1}{42} \quad (1)$$

$$\frac{7}{42} \quad (2)$$

$$\frac{2}{42} \quad (3)$$

$$\frac{6}{42} \quad (4)$$

- ۱۹- فرض کنید X دارای جدول تابع احتمال زیر است و $Y = 3X^2$ باشد. از توزیع احتمال Y، آن قدر نمونه انتخاب می‌کنیم تا اولین صفر ظاهر شود. اگر تعداد این انتخاب‌ها را با Z نشان دهیم، مقدار $P(Z \geq 3)$ کدام است؟

x	-1	0	1
$P(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$

$$(\frac{4}{5})^2 \quad (1)$$

$$\frac{4}{5} \quad (2)$$

$$\frac{3}{5} \quad (3)$$

$$(\frac{3}{5})^2 \quad (4)$$



-۲۰- احتمال انتقال صحیح یک بیت اطلاعات در یک کانال مخابراتی برابر ۱/۰ است. اگر ۱۰۰ بیت اطلاعات از این کانال فرستاده شود، احتمال اینکه تعداد بیت‌هایی که در گیرنده درست دریافت می‌شوند بین ۵ تا ۱۲ بیت باشد، به‌طور تقریبی کدام است؟ (تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد است.)

$$\Phi(0/5) - \Phi(-1/5) \quad (2)$$

$$\Phi(1/5) - \Phi(-0/5) \quad (1)$$

$$\Phi(0/5) - \Phi(-1/5) \quad (4)$$

$$\Phi(1/5) - \Phi(0/5) \quad (3)$$

-۲۱- فرض کنید متغیر تصادفی X دارای توزیع یکنواخت در بازه $(0, 1)$ است. اگر $Y = [nX]$ باشد، مقدار $E(Y)$ کدام است؟ ($[x] =$ جزو صحیح x می‌باشد.)

$$\frac{n-1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{n}{2} \quad (1)$$

$$\frac{n+1}{2} \quad (4)$$

$$\frac{n}{2} + 1 \quad (3)$$

-۲۲- فرض کنید X یک متغیر تصادفی با تابع توزیع زیر باشد. مقدار $E(X)$ کدام است؟

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x+1}{4} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & 1 \leq x \end{cases}$$



$$\frac{1}{8} \quad (1)$$

$$\frac{5}{8} \quad (3)$$

-۲۳- فرض کنید X یک متغیر تصادفی باشد. اگر $E(X) = 1$ و $Var(X) = 5$ باشد، مقدار $E(2+X)^2$ کدام است؟

$$9 \quad (4)$$

$$8 \quad (3)$$

$$12 \quad (2)$$

$$14 \quad (1)$$

-۲۴- اگر F_k نشان دهنده k امین عدد در دنباله فیبوناچی باشد، بهترین زمان برای محاسبه F_n کدام است؟

$$O(n^3) \quad (2)$$

$$O(n) \quad (1)$$

$$O(n \log n) \quad (4)$$

$$O(\log n) \quad (3)$$

-۲۵- در یک گراف غیرجهتدار با n رأس و e یال جمع درجه تمام رئوس کدام است؟

$$2e \quad (2)$$

$$2n \quad (1)$$

$$\frac{2e-2}{2} \quad (4)$$

$$\frac{2n-2}{2} \quad (3)$$

-۲۶- پس از اجرای قطعه کد زیر، k از چه مرتبه‌ای است؟

$k = 0$

for($i = 1; i < n; i++$)

 for($j = 1; j < i; j = j * 2$)

$k = k + j$

$$n^3 \quad (2)$$

$$n \quad (1)$$

$$n^{\frac{3}{2}} \quad (4)$$

$$n^3 \quad (3)$$

- ۲۷- وقتی n عدد بزرگی باشد، در مرتب‌سازی درجی (Insertion Sort) روی n عدد تصادفی تقریباً چه تعداد مقایسه انجام می‌شود؟

(۱) مرتبه کمتر از n^2

(۲) $\frac{2}{3}n^2$

(۳) $\frac{n^2}{2}$

(۴) $\frac{n^2}{4}$

- ۲۸- زمان اجرای الگوریتم مرتب‌سازی سریع (Quick Sort) در بدترین حالت، حالت متوسط و بهترین حالت، به ترتیب از راست به چپ عبارت است از:

(۱) $\theta(n \log n), \theta(n \log n), \theta(n^2)$

(۲) $\theta(n), \theta(n \log n), \theta(n^2)$

(۳) $\theta(n \log n), \theta(n \log n), \theta(n \log n)$

(۴) $\theta(n), \theta(n^2), \theta(n^2)$

- ۲۹- دو آرایه مرتب با طول‌های n و m داریم. کمترین تعداد مقایسه برای به دست آوردن آرایه‌ای مرتب از آن‌ها به طول $n+m$ از چه مرتبه‌ای است؟

(۱) $O(\max\{n, m\})$

(۲) $O(\min\{n, m\})$

(۳) $\theta(\max\{n \log n, m \log m\})$

(۴) $\theta(\min\{n \log n, m \log m\})$

- ۳۰- کدام مورد (موارد) درست است؟

الف - توابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ وجود دارند که $f+g \neq O(g)$ و $f+g \neq O(f)$

ب - اگر برای یک مسئله، الگوریتم با زمان $O(n^3)$ وجود داشته باشد آن‌گاه زمان اجرای سریع‌ترین الگوریتم این مسئله حتماً $O(n^3)$ است.

(۱) هیچ کدام

(۲) هر دو

(۳) فقط (ب)

(۴) فقط (الف)

- ۳۱- چند گزاره زیر درست است؟

الف - یک پشته را می‌توان با دو صف پیاده‌سازی کرد.

ب - یک صف را می‌توان با دو پشته پیاده‌سازی کرد.

ج - یک پشته را می‌توان با یک لیست تک‌پیوندی پیاده‌سازی کرد.

د - یک صف را می‌توان با یک لیست تک‌پیوندی پیاده‌سازی کرد.

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱

- ۳۲- عدد طبیعی a_1, \dots, a_n و یک عدد t داده شده است. در جستجوی دو عدد مانند a_i و a_j هستیم که $a_i + a_j = t$ بهترین زمان متوسط برای این مسئله از چه مرتبه‌ای است؟ (استفاده از جداول درهم‌سازی (Hash))

(۱) $n \log n$


(۲) n^3

(۳) n^2

(۴) ۱

- ۳۳- با اجرای دو الگوریتم جستجوی اول سطح (BFS) و جستجوی اول عمق (DFS) روی گراف زیر، آخرین رأسی که جستجو می‌شود به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(هر دو الگوریتم از ۸ شروع می‌شوند. همچنین اگر بین انتخاب دو رأس تفاوتی نباشد، رأس با شماره کمتر انتخاب می‌شود.)



- (۱) ۴ و ۴
- (۲) ۴ و ۲
- (۳) ۴ و ۲
- (۴) ۲ و ۲

- ۳۴- در رابطه با استفاده از الگوریتم heapsort به عنوان الگوریتم مرتب‌سازی کمکی در مرتب‌سازی radix کدام جمله درست است؟

۲) می‌تواند استفاده شود چون stable است.

۴) می‌تواند استفاده شود چون inplace است.

۱) نمی‌تواند استفاده شود چون stable نیست.

۳) نمی‌تواند استفاده شود چون inplace نیست.

- ۳۵- کدام الگوریتم‌های زیر حریصانه است؟

a = Fractional knapsack , b = Dijkstra , c = Bellman – Ford , d = Kruskal

b,d (۲)

a,b,d (۴)

b,c,d (۱)

a,b (۳)

- ۳۶- فرض کنیم هشت پرونده A, ..., H برای رسیدگی به چهار قاضی B, C, D و A ارجاع شود. هر قاضی باید حداقل به یک پرونده رسیدگی کند ولی به دلایلی پرونده A حتماً باید توسط A رسیدگی شود. به چند روش می‌توان این هشت پرونده را به این چهار قاضی اختصاص داد؟

۱) ۱۰۲۰۰

۲) ۱۰۲۰۲

۳) ۱۰۲۰۴

۴) ۱۰۲۰۶

- ۳۷- فرض کنیم G گراف همبند فاقد یال برشی باشد. رابطه هم ارزی ~ را بر E(G) به صورت زیر تعریف می‌کنیم: e ~ f اگر تنها و اگر e = f یا $e \in \{e, f\}$ یا $G - \{e, f\}$ غیرهمبند است.

گزاره‌های زیر را درنظر بگیرید:

(I) اگر $e \sim f$ و e و f دوره‌های یکسان واقع باشند (هر دو عضو دوری هستند یا هر دو نیستند).

(II) اگر $e \sim f$ و e یال برشی $G - f$ باشد (برای هر $e, f \in E(G)$)

(III) برای هر کلاس هم ارزی F، دوری وجود دارد که شامل کل F است.

چند تا از این گزاره‌ها درست هستند؟

۱) صفر

۲) ۱

۳) ۲

۴) ۳

- ۳۸ - فرض کنیم C ضریب x^r در $(1-x)^n(1+x)^n$ باشد و

$$A = \sum_{k=0}^r (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n}{r-k}$$

$$B = \begin{cases} (-1)^{\frac{r}{2}} \binom{n}{\frac{r}{2}} & r \text{ زوج:} \\ 0 & r \text{ فرد:} \end{cases}$$

در این صورت کدام گزینه درست است؟

A = B = C (۱)

A < B = C (۲)

B = C < A (۳)

B < A = C (۴)

- ۳۹ - محاسبه ضریب x^{12} در $\frac{x+3}{1-2x+x^2}$ کدام است؟

۵۲ (۱)

۵۱ (۲)

۴۰ (۳)

۳۹ (۴)

- ۴۰ - چند عدد ۱۵ رقمی با ارقام ۳، ۵، ۶ و ۸ وجود دارد به طوری که مجموع ارقام آن زوج باشد؟

۲۱۸ (۱)

۲۱۹ و ۲۱۸ (۲)

۲۱۹ (۳)

۲۱۹ از (۴)

- ۴۱ - چند مجموعه ۹ عضوی از اعداد ۳ رقمی وجود دارد که در همه ویژگی‌های زیر صدق کند؟

- هیچ عضوی شامل رقم صفر نباشد.

- هیچ دو عضوی دارای یکان برابر نباشند.

- هیچ دو عضوی دارای دهگان برابر نباشند.

- هیچ دو عضوی دارای صدگان برابر نباشند.

مثالاً یکی از مجموعه‌ها عبارت است از $\{293, 757, 444, 115, 862, 338, 971, 629, 586\}$ یعنی D_9

پریش عدد (۱)

$9! \times D_9$ (۲)

$(9!)^2$ (۳)

$(9!)^3$ (۴)

$(9!)^2 \times D_9$ (۵)

- ۴۲ - ۳۲ کارت در چهار رنگ مختلف و از هر رنگ با شماره‌های ۱ تا ۸ موجود است. به چند روش می‌توان ۵ کارت از بین این ۳۲ کارت انتخاب کرد به طوری که این پنج کارت حداقل از دو رنگ باشند؟

(۱) ۱۲۹۹۲

(۲) $6 \times \binom{26}{5}$

(۳) ۲۵۷۶۰

(۴) $3 \times \binom{26}{5}$

- ۴۳ - دنباله زیر را در نظر بگیرید:

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = 15$$

$$\forall n \geq 2 \quad a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

تعداد عوامل اول متمایز a_{10} چند است؟

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

- ۴۴ - G یک گراف ۲۲ رأسی است که یال‌های آن به یک تطابق کامل و یک دور همیلتونی افزایش می‌شود، G چگونه است؟

(۱) همیلتونی است اما اویلری نیست.

(۲) اویلری است اما همیلتونی نیست.

(۳) هم اویلری است هم همیلتونی

(۴) نه اویلری است نه همیلتونی

- ۴۵ - به چند طریق می‌توان با ۷ رنگ گراف زیر را رنگ‌آمیزی کرد، به طوری که دو سر هیچ یالی هم رنگ نباشد؟

(ممکن است برخی رنگ‌ها استفاده نشوند).

(۱) $7 \times 6^4 \times 5^4$

(۲) $7^2 \times 6^3 \times 5^4$

(۳) $7 \times 6^3 \times 5^4 \times 4$

(۴) بستگی دارد از چه رأسی رنگ‌آمیزی را شروع کنیم.

